



ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ МАЛОГО ТАЗА (У МУЖЧИН)

- За 2 суток перед исследованием необходимо исключить из своего рациона грубую клетчатку (капуста, другие овощи и фрукты), газированные напитки, черный хлеб, молочные продукты.

- Для устранения газообразования необходимо принять «Эспумизан» (по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, утром в день исследования 2 капсулы, не запивая водой) или принять активированный уголь в расчете 2 таблетки на 10 кг массы тела.

- Исследование проводится натощак – последний прием пищи должен быть не позже, чем за 6 часов до начала исследования.

- За 30-40 минут перед началом исследования необходим прием 2 таблеток «Но-шпа».

- Исследование проводится с умеренно наполненным мочевым пузырем, для чего рекомендуется помочиться за 1 час до исследования, после чего не мочиться.

**В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ БОЛЬНОЙ МОЖЕТ ПРОЙТИ МР ТОМОГРАФИЮ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО
И ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.**

+7 (812) 600-78-78

[https://mrt.center/
MRT@avaclinic.ru](https://mrt.center/MRT@avaclinic.ru)